HERBICIDA

SALVO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

SALVO® es un herbicida hormonal de aplicación en postemergencia temprana del cultivo de cereales, prados de gramíneas y pastizales. Es un herbicida que controla las malas hierbas de hoja ancha. Se absorbe, principalmente por las hojas de las malas hierbas, y se trasloca rápidamente al resto de la planta.

Nº DE REGISTRO: 25.683

COMPOSICIÓN: 2,4D (sal dimetilamina) 50% p/v

FORMULACIÓN:

Suspensión líquida [SL]. Presentada en forma de suspensión líquida para aplicar en pulverización.

PRESENTACIÓN:

Envase de 5 y 10L.

MODO DE ACCIÓN:

Materia activa	**SALVO ® 2,4 D Sal Amina**
El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es un herbicida hormonal, fenoxi derivado, que fue introducido en el año 1954 como el primer herbicida sistémico y selectivo para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de cereales, siendo ampliamente usado en la actualidad. Los herbicidas fenoxi derivados pueden ser formulados bajo la forma de sales o de ésteres debido a que en su forma ácida son poco solubles en agua. SALVO es activo contra importantes malas hierbas de hoja ancha de los cultivos autorizados, entre las que destaca: *Sinapsis arvensis* (mostaza de campo), *Capesella bursa-pastoris* (capsela), *Cirsium, Chenopodium album*, *Thiapsi arvense* (carrasquipe), Plantago sp., Calystegia sepium, Chenopodium polyspermum, Urtica urens *Portluca* (verdolaga), *Equisetum* (cola de caballo), *Sisymbrium crassifolium* (jaramago), Fumaria officinalis (conejitos), *Cyperus rotundus.* Son medianamente sensibles: *Polygonum aviculare* y *Sonchus arvensis.*	- Sal y no éster: tiene un espectro de acción común, y además las sales controla: *Brassica, Commelina*, *Fumaria officinalis* (conejitos), *Portulaca oleracea* (verdolaga), *Sagittaria.* - Como sal amina se puede mezclar con otros productos formulados con sales aminas como: dicamba, MCPA, MCPP, Clopiralida. - SALVO ® por ser una sal amina es más segura, no hay tanta volatilidad que un éster. Siempre se debe de cuidar que no haya deriva pero presenta mayor seguridad. - SALVO ® está clasificado Xi, mientras otros 2,4D son Xn. - Buena disolución en agua

Modo de empleo:

Cultivo y beneficio	Momento de aplicación	Núm. De aplicación y dosis	P.S.
Cereales (Trigo, Avena, Cebada y Centeno.) Dicotiledóneas	Entre ahijado y encañado del cultivo. Post emergencia de la mala hierba	1,2-2L/ha	20
Prado de gramíneas. Dicotiledóneas	Aplicar antes del corte o pasto del cultivo. Post emergencia de la mala hierba	2,4-2,8L/ha	20
Pastizales. Dicotiledóneas	Aplicar antes del corte o pasto del cultivo. Post emergencia de la mala hierba	2,4-2,8L/ha	20

Consejos de uso y precauciones:

Aplicar en pulverización con un volumen de caldo de 200 a 1000L/Ha, variando la dosis en función del cultivo y estadio de desarrollo de las malas hierbas.

Seguir la normativa relativa a herbicidas hormonales (Orden MAPA de 8 de Octubre de 1973) Se consideran **cultivos sensibles** a todos los herbicidas hormonales: el algodonero, los cultivos de crucíferas, cultivos de leguminosas, frutales de hueso y pepita, cítricos, olivo, girasol, lechugas, remolacha, tomate, vid, pepino, tabaco, estramonio, cultivos de flores ornamentales y de arbustos frutales. Debe guardarse una franja de seguridad de 20m de distancia con estos cultivos sensibles. No efectuar tratamientos en días de viento y tomar precauciones para evitar daños en cultivos colindantes.
Se aconseja no pastar las hierbas los 20 días que siguen la aplicación. Se recomienda realizar la aplicación con temperatura superior a 12ºC e inferior a 25ºC.
Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas. Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15ºC o más de +40ºC. Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para limitar la aparición de resistencias, alternar con otros herbicidas con distinto tipo de acción.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.